



ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Tratamiento con Interferón Beta-1a

Disminución del Daño Crónico en Esclerosis Múltiple con Interferón Beta-1a

University of British Columbia, Vancouver, Canadá; University Hospital Basel, Basilea, Suiza

Calidad de Vida en Adolescentes con Esclerosis Múltiple que se Autoadministran Interferón Beta-1a

Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate, Gallarate, Italia; Medical Affair Department Merck Serono, Roma, Italia

Comparación de Interferón Beta-1a frente a Fármacos Orales en Pacientes con Esclerosis Múltiple


Swedish Neuroscience Institute, Seattle; CK Consulting Associates, St. Helena Island, EE.UU.; EMD Serono, Inc., Nueva York, EE.UU.



MERCK

Tasas no ajustadas de recaídas para todos los grupos de tratamiento, un año después de la iniciación del TME.

Características de las recaídas un año después del TME n (%)	IFN beta-1a s.c. (n = 978)	Teri unomida (n = 330)	Fingolimod (n = 883)	Dimetil fumarato (n = 2284)
--	----------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------



TME, tratamiento modificador de la enfermedad; SE, sala de emergencia; IFN beta-1a, interferón beta-1a; s.c., subcutáneo; EM, esclerosis múltiple.

17om...
 1ovpv...
 PCmptblo77...
 Sv...
 mtv...
 t-1ommbm1b-7...
 7u...
 m...
 1om...
 mo...
 ov...
 t...
 1ov...
 vb...
 t...
 1om...
 ou...
 t...
 om...
 t...
 b...
 b...
 b...

om...
 t...
 t...
 ov...
 m...
 b...
 -...
 o...
 r...
 o...
 mt...
 t...
 b...
 m...
 v...
 r...
 m...
 -...
 -...
 -...
 -...
 r...
 r...

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2019 www.sicisalud.com

