

Nebivolol frente a Bisoprolol en la Función Sexual de las Mujeres Hipertensas

Estudio prospectivo aleatorizado de etiqueta abierta y de dos brazos

Pacientes hipertensas




Edad: 20 a 50 años
n = 300

Tratamiento 5 mg/día

Nebivolol 

Bisoprolol 

Puntuación sexual (ISFS)



Nebivolol
26.91 ± 2.6
p < 0.0001

Bisoprolol
24.12 ± 2.0
p = 0.91

Seguimiento: 90 días
ISFS, índice de función sexual femenina

El tratamiento con **nebivolol** se asoció con una mejora significativa de la función sexual en pacientes hipertensas a los 90 días.

Cureus

Comparison of Effect of Nebivolol and Bisoprolol
on Sexual Function of Hypertensive Female Patients

13(5): e15062 Mayo 2021

DOI: 10.7759/cureus.15062

Liaquat University of Medical and
Health Sciences, Jamshoro, Pakistán

Las pacientes con hipertensión son más proclives a presentar disfunción sexual, en general asociada al uso de betabloqueantes. El tratamiento con nebivolol se asoció con una mejora significativa en la función sexual, debido a sus propiedades vasodilatadoras adicionales y al bajo riesgo de efectos secundarios sexuales..

Resumen SIIC

Nebivolol Mejora la Función Sexual de Mujeres Hipertensas

Texto Completo Autorizado TCA (full text)



Ingrese al ReSIIC