Sociedad Iberoamericana de Información Científica

Acción de la Duloxetina sobre el Trastorno Depresivo Persistente

Dos estudios aleatorizados, a doble ciego y con grupo control

Pacientes con TDP Puntaje ≥ 12 en la HAMD	Duloxetina (n = 65) Desvenlafaxina (n = 59)	Placebo	Valor de p
HAMD	↓ ↓ ↓	↓	$p < 0.001$
Interacción tratamiento/tiempo sobre sigma	+ + +	+	$p = 0.038$
Interacción tratamiento/tiempo sobre lambda	+ + +	+	$p = 0.046$

HAMD, *Hamilton Depression Rating Scale;* TDP, trastorno depresivo persistente

Existe asociación entre el incremento del coeficiente de agrupamiento nodal del tálamo y la mejoría de los síntomas del TDP en los pacientes que recibieron duloxetina y desvenlafaxina.

BRAIN COMMUNICATIONS	Serotonin–norepinephrine Reuptake Inhibitor Antidepressant Effects on Regional Connectivity of...	4(3), Abr 2022	DOI: 10.1093/braincomms/fcac100	The Second Xiangya Hospital of Central South University, Hunan, China

Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina son los antidepresivos de elección utilizados en la práctica clínica para el tratamiento del trastorno depresivo persistente. Estos aumentan la conectividad regional del tálamo y disminuyen los síntomas.

Resumen SIIC (ReSIIC)

Inhibidores de la Recaptación de Serotonina y Noradrenalina en el Trastorno Depresivo Persistente

Texto Completo Autorizado TCA *(fulll text):* Serotonin–norepinephrine Reuptake Inhibitor Antidepressant Effects on Regional Connectivity of...

Ingrese al ReSIIC