

Eficacia Comprobada de la Cariprazina en el Tratamiento de la Depresión Bipolar

Estudio fase III, aleatorizado, a doble ciego y controlado con placebo




Adultos (18-65 años) con depresión bipolar tipo I, sin características psicóticas, con un episodio depresivo mayor de entre 4 semanas y 12 meses




6 semanas + 1 semana sin medicación

Reducción en la escala de MADRS



MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale.

Tasa de remisión a la semana 6 (escala MADRS)



Tasas de síntomas extrapiramidales: **< 5%** con cariprazina 1.5 mg/día y 3 mg/día

La cariprazina, en dosis de 1.5 mg/día y 3 mg/día, es eficaz, segura y bien tolerada con una baja tasa de efectos adversos graves como extrapiramidalismo.

The American Journal of Psychiatry

Cariprazine Treatment of Bipolar Depression...

176(6):439-448, Jun 2019

DOI: 10.1176/appi.ajp.2018.18070824

University Health Network, Toronto, Canadá

Se demuestra que el tratamiento con cariprazina, en dosis de 1.5 mg/día y 3 mg/día es eficaz, generalmente se tolera bien y es relativamente segura para reducir los síntomas depresivos en adultos con depresión bipolar I.

Resumen SIIC

Cariprazina para el Tratamiento de la Depresión Bipolar

Texto completo autorizado (TCA) full text: <https://psychiatryonline.org/doi/epdf/10.1176/appi.ajp.2018.18070824>



Ingrese al ReSIIC